

9) Secourir en cas de malaise

LE MALAISE

Identifier les signes qui imposent un avis médical (Samu)
face à une victime qui présente un malaise

Observer*, protéger/



Mettre au repos, dans une position de confort/



Desserrer les vêtements en cas de gêne/

Rassurer la victime

Interroger

- « Depuis combien de temps dure ce malaise ? »
- « Avez-vous déjà présenté ce type de malaise ? »
- « Prenez-vous des médicaments ? »
- « Avez-vous été hospitalisé récemment ? »
- « Quel âge avez-vous ? »



À la demande de la victime, lui donner/ :

- son traitement éventuel
- du sucre (en morceaux)

Alerter le 15 et appliquer les consignes/



* Les **signes observables** peuvent être de différentes natures :

- o douleur dans la poitrine ;
- o douleur abdominale intense ;
- o difficulté à respirer ou à parler ;
- o sueurs abondantes, sensation de froid ou pâleur intense ;
- o apparition soudaine d'un ou plusieurs signes suivants :
 - o faiblesse ou paralysie d'un membre ;
 - o déformation de la face ;
 - o perte de vision uni ou bilatérale ;
 - o difficulté de langage ou de compréhension ;
 - o mal de tête sévère, soudain et inhabituel ;
 - o perte d'équilibre, instabilité de la marche ou chutes inexplicables.