



Différences entre chameaux et dromadaires

Les chameaux et les dromadaires sont souvent confondus et pour cause : ils appartiennent à la même famille, celle des camélidés. Le dromadaire est même parfois appelé chameau d'Arabie. Ils ont beaucoup en commun, mais certaines caractéristiques les distinguent toutefois.

Habitats

Le dromadaire est un habitant des déserts chauds d'Afrique, d'Australie, du Proche et du Moyen-Orient alors que le chameau se retrouve en zone froide comme la Mongolie.

Caractéristiques physiques

À la naissance, le chameau possède deux bosses et le dromadaire une seule. Cependant, il est intéressant de savoir que le dromadaire possède génétiquement les deux bosses, mais que celles-ci se fondent en une seule avant la naissance. Contrairement à la croyance populaire, la bosse du dromadaire et celles du chameau ne sont pas remplies d'eau, mais de graisse. Les deux peuvent boire une quantité incroyable d'eau en une seule fois (environ 120 litres) et peuvent se passer de nourriture très longtemps.

Les chameaux et dromadaires atteignent la même taille adulte de 1,80 mètres à 2,30 mètres au garrot (mesure du sol à la base du cou). Le poids du chameau varie de 600 à 800 kg. Celui du dromadaire varie un peu plus, entre 450 et 900 kg.

Utilisation

Le dromadaire a longtemps été utilisé à des fins militaires lors des batailles ou pour le transport de troupes et du matériel. Il rend de multiples services à l'homme depuis des milliers d'années, en particulier aux peuples nomades qui l'exploitent pour son cuir, son lait, sa viande et sa force physique. Le chameau est également utilisé comme animal de transport, mais également comme animal à viande (plats de fête). La chamelle produit un lait très riche en vitamine C.

Marie-Julie Godbout (2014) Informations tirées de fr.wiktionary.org/wiki/dromadaire -CC-BY-SA 3.0

Photo : Sébastien Barrette 